

de verkregen psychosen, en dat hare verschijnselen geheel ver-
loopen binnen de grenzen van een psychologisch proces, wat
voor de laatstgenoemde groep in 't geheel niet of slechts in zeer
geringe mate geldt.

II.

PRIMAIRE OF WARE ZIELSZIEKTEN.

De groep der kiempsychosen, welke ons het meeste belang
inboezemt, wordt door JELGERSMA onderverdeeld in :

1. De manisch-depressieve psychose.
2. De hysterie.
3. De paranoïa.
4. De psychasthenie.
5. De psychopathische persoonlijkheden of degeneratieve toe-
standen.

Het ligt natuurlijk buiten het kader van dit opstel, deze ver-
schillende psychosen meer in details te bespreken. Slechts wat
voor ons doel van belang is, zal daarom door mij vermeld worden.

Deze indeeling moge bij oppervlakkige beschouwing al weinig
afwijken van meerdere andere psychiatrische stelsels, die alle
psychische afwijkingen in endogene en exogene psychosen in-
deelen; in de eigenschappen, die door JELGERSMA aan de kiem-
psychosen worden toegekend, vertoont zij een karakteristiek onder-
scheid met alle andere systemen. Door JELGERSMA wordt er toch
bijzonder op gewezen, dat deze vijf ondergroepen niet alleen ge-
leidelijke overgangen met het normale vertoonen, maar dat zij
ook onderling in elkaar overgaan en mengvormen te zien geven.
Vooral door dit laatste onderscheidt JELGERSMA's psychiatrie zich
van alle andere stelsels.

Deze beide eigenschappen der kiempsychosen acht ik voor ons
doel zeer gewichtig; ik zal ze daarom nog wat breeder toelichten.
De manisch-depressieve psychose is een vorm van krankzinnig-
heid in welke de hoofdafwijking in het affect- of gemoedsleven
van den patient moet gezocht worden. Dit kan zich openbaren
in een gedrukte (melancholische) of in een opgewekte (maniacale)